

BULETIN DE AVERTIZARE*Grapholita funebrana*

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Vierme prun G1**, (*Grapholita funebrana*), **T1 + T2, Pătare roșie prun** (*Polystima rubrum*), **Monilioza sâmburoaselor** (*Monilinia* spp.), care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

Prun

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **preventiv și curativ boli și dăunători**.
Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Exirel = 0,5-0,9 l/ha + Signum (Syrex Star) = 0,5 kg/ha sau**
2. **Deltagri (Faster Delta) = 0,25-0,3 l/ha+ Luna Experience 400 SC = 0,5 l/ha.**

Perioada optimă de tratament: tratamentul I – perioada 28 mai – 01 iunie;

- **tratamentul II** – la interval de 9 – 14 zile când este timp rece (cu temperaturi mai scăzute noaptea, cuprinse între 9-12°C, care determină ritm încetinit al evoluției dăunătorului), și la 8 zile când sunt temperaturi de 18 – 22 °C, cu un insecticid din altă grupă chimică.

Alte recomandări:

- Pentru combaterea acestor organisme de dăunare puteți folosi și alte produse de protecția plantelor omologate.
- **Atenție!** În cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.
- Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalației de stropit;
- Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în categoriile de **toxicitate acută** (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin **pictograma GHS06** și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „Pericol”) pot fi utilizate exclusiv de către persoanele juridice care dețin o **autorizație specială** pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricole, așa cum sunt prevăzute în **"Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor"** - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatare, precum și **registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

