


BULETIN DE AVERTIZARE*Hoplocampa spp.**Monilinia spp.*fructe atacate de *Hoplocampa spp.*

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Viespile cu ferăstrău ale prunului** (*Hoplocampa minuta*, *Hoplocampa flava*), **Viespea semințelor de prun** (*Eurytoma schreineri*) **T1 + T2**, **Pătare roșie T1** (*Polystigma rubrum*), **Monilioza sâmburoaselor** (*Monilinia l.*)

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de **Prun**

pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **PED viespi** = 2 % flori cu pontă. Tratament de siguranță pentru monilioză.

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Laser 240 SC (Nexuba) = 0,6 l/ha + Signum (Syrex Star) = 0,5 kg/ha.**
2. **Deltagri (Faster Delta) = 0,25 – 0,3 l/ha + Folicur Solo 250 EW (Valor 250 EW) = 0,75 l/ha_sau**
3. **Karate Zeon (Ninja) = 0,15 l/ha + Orius 25 EW (Salvator 25 EW) = 0,75-1,0 l/ha.**

Perioada optimă de tratament: Tratamentul se va aplica diferențiat în funcție de microclimatele zonale ale județului Vaslui, respectând faza fenologică - "când florile au început să-și scuture petalele" **pentru Viespile cu ferăstrău ale prunului** (*Hoplocampa m.* și *Hoplocampa f.*) și fenofaza "desprinderea calicului florilor" **pentru Viespea semințelor de prun** (*Eurytoma schreineri*).

Precizări!

Viespea semințelor de prun (*Eurytoma schreineri*): ierneză ca larvă în sâmburii infestați căzuți pe sol. După apariție, viespile perforează pulpa fructelor și depun ouăle în semințele crude. Viespea sâmburilor prezintă pericol până la lemnificarea sâmburilor.

Viespile cu ferăstrău ale prunului (*Hoplocampa spp.*): ierneză ca larvă în solul de sub scoarța pomilor, la 2 -10 cm. Depun ouăle în epiderma unei sepale sau receptaculul floral, **iar apariția larvelor coincide cu căderea petalelor.**

Alte recomandări:

- **Atenție!** În cazul tratamentelor complexe efectuați în prealabil testul de compatibilitate.
- **Citiți cu atenție toate informațiile de pe eticheta produselor.**
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**
 1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
 2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în categoriile de **toxicitate acută** (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin **pictograma GHS06** și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „**Pericol**”) pot fi utilizate exclusiv de către persoanele juridice care dețin o **autorizație specială** pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate și depozitate în exploatație, precum și **registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**, conform modelului::

| Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării / fenofaza culturii | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/dăunător/buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Supra-fața (ha) | Cantități utilizate (kg, l) | | | |

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

